

**ELENCO PATOLOGIE CHE DETERMINANO LA CONDIZIONE DI FRAGILITA' E DISABILITA'**

<b>Aree di patologia</b>	<b>Definizione</b>
Malattie respiratorie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibrosi polmonare idiopatica</li> <li>• Altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia</li> </ul>
Malattie cardiocircolatorie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA)</li> <li>• Pazienti post shock cardiogeno</li> </ul>
Malattie neurologiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone</li> <li>• Sclerosi multipla</li> <li>• Distrofia muscolare</li> <li>• Paralisi cerebrali infantili</li> <li>• Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive*</li> <li>• Miastenia gravis</li> <li>• Patologie neurologiche disimmuni</li> </ul>
Diabete / altre endocrinopatie severe (quali morbo di Addison)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti con diabete di tipo 1</li> <li>• Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze.</li> <li>• Soggetti con morbo di Addison</li> <li>• Soggetti con panipopituitarismo</li> </ul>
Fibrosi cistica	Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base
Insufficienza renale / patologia renale	Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico
Malattie autoimmuni - immunodeficienze primitive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza*</li> <li>• Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico*</li> </ul>
Malattia epatica	Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica
Malattie cerebrovascolari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto</li> <li>• Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3</li> </ul>
Patologia oncologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione</li> <li>• Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure*</li> </ul>
Emoglobinopatie	Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi
Sindrome di Down	Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili

Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido*</li> <li>• pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva*</li> <li>• pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva*</li> </ul>
Grave obesità	Pazienti con BMI maggiore di 35
HIV	Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4
* Vaccinare anche i conviventi	
Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari.	

### Disabilità gravi

Condizione	Definizione
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica)	Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3**
** vaccinare familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto	